

( )

Такая компоновка клинических форм заболевания позволяет ограничить определенный ассортимент инфекций, типичный для каждого типа патологии. Это даст возможность более рационально применять эмпирический выбор препаратов на начальном уровне терапии.

Из рабочей группы в последнее время в ранее закрепившемся понимании убрана атипичная пневмония как заболевание, вызванное атипичными агентами и имеющая атипичную симптоматику заболевания. Этим понятием (атипичная пневмония) в России в настоящий период выделяют «тяжелый острый респираторный синдром — ».

— острое заболевание, появившееся во внебольничных стенах, причисляется к самым распространенным типам этой патологии и имеет самую типичную клиническую картину. По-прежнему пневмония, которые появляются в замкнутых коллективах среди молодежи (школьники, студенты, солдаты) и часто имеет характер эпидемической пандемии, проходит со стертой симптоматикой. К внутрибольничным (нозокомиальным) причисляют и те формы, которые сформировались в течение 48-72 и более после обращения пациента в больницу по поводу другой болезни.

Аспирационная пневмония имеет место очень часто у лиц, страдающих алкогольной зависимостью и наркоманией, реже — после операций при подаче наркоза.

:

1) [Патогенез инфекционного миокардита](#)

2) [Полиартриты](#)