

---

Изменения волосяного покрова имеют известное диагностическое значение, особенно дефекты его, как и случаи чрезмерного разрастания.

Не останавливаясь на ряде заболеваний волос, относящихся к компетенции дерматолога, укажем, что, например, раннее облысение, особенно преждевременное поседение, лишь в некоторых случаях могут свидетельствовать о чрезмерной «изношенности» организма, рано наступающем его старении. Имеет значение как степень развития волос в местах, где их появление есть проявление вторичных половых признаков, так и характер распространения волосяного покрова. Так, отсутствие растительности на лице у мужчин в возрасте половой зрелости (старше 18-20 лет) или развитие растительности на лице у женщин свидетельствует о некоторых эндокринных нарушениях. То же относится и к характеру распространения волосяного покрова на лобке. У женщин оно ограничивается областью лобка, а у мужчин распространяется на промежность и вверх на кожу живота по ходу белой линии к пупку. У многих мужчин развита растительность на конечностях, груди и даже на спине. Такое же точно оволосение у женщин говорит о нарушении деятельности эндокринных желез. Так, например, развитие у них волос на лице встречается при болезни (синдроме) Иценко — Кушинга (базофильная аденома передней доли гипофиза), при некоторых опухолях надпочечника и т. п.

Наряду с этим при таком эндокринном заболевании, как микседема, наблюдается выпадение волос на голове, из бровей, ломкость их. Выпадение и ломкость волос на голове, лице, под мышками, на лобке встречается при склеродермии и при алиментарной дистрофии. Изменение волос бывает и при некоторых заболеваниях кроветворных органов. Так, при хлорозе, особенно позднем, а также при аддисон-бирмеровской анемии наблюдается раннее поседение волос и их выпадение. Раннее поседение волос, особенно на передней поверхности грудной клетки, Я. Е. Рашба считал признаком аортокардиосклероза и атеросклероза вообще. Однако вряд ли можно согласиться с этим.

Наконец, исследование волос имеет особое значение в дерматологии. Во-первых, оно дает возможность распознать непосредственные заболевания волос — паршу, стригущий лишай и пр., а в других случаях по некоторым нарушениям волосяного покрова головы, в частности по выпадению волос на голове небольшими ограниченными, округлой формы участками, можно заподозрить сифилис во вторичном его периоде.